

COLINOX[®]

Gocce Orali

Sospensione Gastrofunzionale

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto.

1. Che cos'è Colinox[®] e a che cosa serve

Colinox[®] sospensione orale gastrofunzionale è un'emulsione densa a base di Simeticone, FOS (Frutto-oligosaccaridi) e GOS (Galatto-oligosaccaridi). È un dispositivo medico che agisce attraverso la riduzione della tensione superficiale delle bolle gassose che si formano all'interno dell'apparato digerente.

Indicato nel trattamento di meteorismo, aerofagia e coliche gassose del lattante, del bambino e dell'adulto, anche in presenza di alterazioni della flora batterica intestinale. Indicato nei disordini dispeptici, in tutti i casi in cui sia richiesta la riduzione dei tempi dello svuotamento gastrico e nel trattamento della sindrome dell'intestino irritabile.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare Colinox[®]

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto (vedere parte 6).

Non sono note controindicazioni e/o effetti collaterali derivanti dall'utilizzo del prodotto.

3. Come utilizzare Colinox[®]

Agitare energicamente il flacone prima dell'uso. Al fine di favorire la corretta erogazione in gocce del prodotto, praticare una leggera pressione sul flacone.

Adulti e bambini:

20 gocce, eventualmente da diluire in un liquido, 2-4 volte al giorno preferibilmente dopo i pasti o secondo diverso parere del medico.

Lattanti:

10 gocce, eventualmente da diluire in un liquido, 2-4 volte al giorno preferibilmente dopo i pasti o secondo diverso parere del medico.

4. Avvertenze

- È consigliabile interporre un intervallo di almeno un'ora tra l'assunzione del prodotto e quella dei farmaci.
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione si presenta non integra o manomessa. La manomissione e/o la mancata integrità della confezione potrebbero compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto stesso.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- Conservare il prodotto ad una temperatura non superiore ai 30 °C.
- Il prodotto può essere utilizzato fino a 6 mesi dopo la prima apertura.

5. Come conservare Colinox[®]

- Conservare lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini.

6. Composizione

Simeticone (emulsione 30%) (86,04%), Frutto-oligosaccaridi (FOS), Galatto-oligosaccaridi (GOS), Fruttosio, Sodio benzoato, Sodio idrato, Aroma Banana Matura.

Altre informazioni

In caso di incidente grave si prega di segnalarlo immediatamente al fabbricante ed alla Autorità Competente di riferimento.

Confezione: Flacone da 20 ml.

20 ml

REF	90COL020M
-----	-----------

5 ml (Campione Gratuito)

REF	80COL020M
-----	-----------

Rev. 04/03/2026



MADE IN ITALY



DRUGS MINERALS AND DERIVATES ITALIA

via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - Italia - www.dmgit.com

COLINOX[®]

Oral Drops

Gastric Functional Suspension

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What is Colinox[®] and what it is used for

Colinox[®] oral gastric functional suspension is an emulsion based on Simethicone, FOS (Fructo-oligosaccharides) and GOS (Galacto-oligosaccharides). It is a medical device that acts by reducing the surface tension of gas bubbles that form inside the digestive apparatus.

Indicated for the treatment of meteorism, aerophagy and gas colics in infants, children and adults, even in the cases of alteration of the intestinal bacterial flora. Indicated for dyspeptic disorders, in all cases where a reduction in gastric emptying time is required and in the treatment of irritable bowel syndrome.

2. What you need to know before using Colinox[®]

Do not use in case of known hypersensitivity to the components of the product (see section 6).

There are no known contraindications and/or side effects resulting from using the product.

3. How to use Colinox[®]

Shake the bottle well prior to use. In order to promote proper dropwise dispensing of the product, squeeze the bottle with light but sufficient pressure.

Adults and children:

20 drops, possibly diluted in liquid, 2-4 times per day, preferably after meals or according to different medical advice.

Infants:

10 drops, possibly diluted in liquid, 2-4 times per day, preferably after meals or according to different medical advice.

4. Warnings

- It is recommended to take Colinox[®] at least 1 hour before or after any medicines.
- In case of adverse reactions, discontinue the use of the product and consult a doctor.
- Close the bottle well after use.
- Do not use the product if the packaging appears not intact or there is evidence of tampering. Tampering and/or non-intactness of the packaging could compromise the safety requirements of the product.
- Do not use the product after the expiry date indicated on the packaging. The expiry date refers to the product in undamaged packaging and correctly stored.
- Store the product below 30°C.
- The product can be used up to 6 months after first opening.

5. How to store Colinox[®]

- Store away from heat sources and out of the reach of children.

6. Composition

Simethicone (30% emulsion) (86,04%), Fructo-oligosaccharides (FOS), Galacto-oligosaccharides (GOS), Fructose, Sodium benzoate, Sodium hydrate, Ripe Banana Flavour.

Further information

In case of serious accident please report immediately to the Manufacturer and to the relevant Competent Authority.

Presentation: 20 ml bottle.

20 ml REF 90COL020M

5 ml (Free Sample) REF 80COL020M

Rev. 04/03/2026



MADE IN ITALY



DRUGS MINERALS AND DERIVATES ITALIA

via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - Italy - www.dmgit.com

30FG240M-A1 1-27/03/2026