

PANAMIR®

IT

Sospensione Gastroattiva

Indicazioni:

Indicato nel trattamento della sindrome dispeptica, nel trattamento dell'aerofagia e del meteorismo intestinale. Favorisce lo svuotamento gastrico. Riduce la sintomatologia di nausea e vomito.

Composizione:

Simeticone (emulsione 30%), fruttosio, gomma xanthan, potassio sorbato, sodio benzoato, acido sorbico, BHT, acqua depurata, aromi naturali.

Modalità d'uso:

Nelle forme dispeptiche 2 somministrazioni/die da 10 ml cad. (ogni 12 ore).

In pediatria:

Fino a 10 kg di peso corporeo: dose da 2,5 ml per 1-4 somministrazioni/die.

Fino a 20 kg di peso corporeo: dose da 2,5 /5 ml per 1-4 somministrazioni/die.

Maggiore di 20 kg di peso corporeo: dose da 5 /10 ml per 2-4 somministrazioni/die fino ad un massimo di 20 ml/die.

Controindicazioni:

Controindicato nei casi di occlusione intestinale.

Avvertenze:

- Agitare energicamente prima dell'uso.
- Conservare lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini.
- È consigliabile interporre un intervallo di almeno un'ora tra l'assunzione di Panamir e quella di farmaci.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto.
- Per l'assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
- In caso di reazione avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- È consigliato non utilizzare il prodotto dopo 60gg dall'apertura del flacone.

Contiene cucchiaino dosatore.

200 ml e



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmg.it

Rev. 07/2019

PANAMIR®

Gastro-active Suspension

EN

Indications:

The product is indicated for the treatment of dyspeptic syndrome, aerophagy and intestinal meteorism. Promotes gastric emptying. Reduces symptoms of nausea and vomit.

Composition:

Simethicone (30% emulsion), fructose, xanthan gum, potassium sorbate, sodium benzoate, sorbic acid, BHT, purified water, natural flavors.

Usage:

In case of dyspeptic syndrome take twice a day, 10 ml each time (12 hours).

Pediatric use:

For infants up to 10 kilograms of body weight: 1-4 times/day, a dose of 2,5 ml each.

For infants and young pediatric patients up to 20 kilograms of body weight: 1-4 times/day, a dose of 2,5/5 ml each.

For pediatric patients larger than 20 kilograms: 2-4 times/day, a dose of 5/10 ml each, to a maximum of 20 ml /day.

Contraindications:

Do not use in case of intestinal occlusion.

Cautions:

- Shake well before use.
- Keep away from heat sources and out of reach of children.
- It is recommended to take Panamir at least 1 hour before or after any medicines.
- Do not use in case of known hypersensitivity to the product's ingredients.
- Talk to your doctor before taking this product if you are pregnant or are breast-feeding.
- In case of adverse reaction stop using the product and consult your physician.
- Close the bottle well after use.
- Do not use the product after the expiry date shown on the package.
- Use within 60 days after first opening.

It contains a measuring spoon.

200 ml e



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com

Rev. 07/2019 20FG2103-A1 2-19/01/2021